

QuantIFERON® TB Gold Plus

Determinación de interferón- γ (IFN- γ) en sangre como respuesta a los antígenos peptídicos ESAT-6 y CFP-10, asociada al diagnóstico de Tuberculosis

Indicaciones para pacientes

Este test expone a sus linfocitos a los antígenos ESAT-6 y CFP-10, los cuales son específicos de *Mycobacterium tuberculosis* y los resultados no están influenciados por la BCG ni dan reacciones cruzadas con la mayoría de las micobacterias atípicas (con excepción de *Mycobacterium kansasii*, *szulgai* y *microti*).

El diagnóstico o la exclusión de la Tuberculosis (TB), así como la valoración de las probabilidades de infección latente, requieren una combinación de pruebas epidemiológicas, anamnésicas, médicas y diagnósticas que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados de QuantiFERON®-TB Gold Plus.

En FPM, para TB realizamos:

- PCR para *M. tuberculosis* en BAL, LCR, líquido pleural y biopsia pleural.
- Cultivo de esputo, aspirados traqueales, BAL, mini BAL entre otros tipos de muestras (incluye directo con coloración de ZN).
- Prueba de tuberculina (PPD/mantoux).

Indicaciones:

- Ayuno de 8 hs.
- Si necesita este resultado para realizar un viaje al exterior debe avisar al extraccionista para que se deje registro.