

CHLAMYDIA TRACHOMATIS y MYCOPLASMA GENITALIUM (Detección por PCR)

MUJERES

72 horas previas a la realización del estudio debe tener en cuenta:

- Mantener abstinencia sexual
- No aplicarse cremas ni óvulos, ni tomar antibióticos; o por lo menos haber terminado el esquema de tratamiento una semana previa a la toma de muestra.
- No utilizar desodorantes ni talcos.
- No realizar el estudio en periodo de menstruación.

Muestra: Cepillado endocervical. Se toma en el laboratorio.

Si la paciente está embarazada o por recomendación médica no puede realizarse cepillado endocervical consultar al laboratorio.

HOMBRES

72 horas previas a la realización del estudio debe tener en cuenta:

- Mantener abstinencia sexual
- No realizar tratamiento con antibiótico o con cremas los días previos.

Muestra: Orina

Antes de recolectar la muestra realizar higiene genital externa con agua y jabón. El paciente debe tener una **retención urinaria de al menos 4 horas**. Recolectar el **primer chorro miccional** en frasco estéril (que cubra el fondo del frasco, pero que no supere 1 ó 2 cm de altura del mismo).





CADA PACIENTE QUE CONFÍA EN
NOSOTROS PERMITE GENERAR
RECURSOS QUE DESTINAMOS A LA
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

Entregar el material en el laboratorio hasta las 16:00 o al día siguiente, en este caso, mantenerlo en heladera.

