

## RECOLECCIÓN DE MATERIA FECAL PARA ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI, CALPROTECTINAS y CUERPOS REDUCTORES

Indicaciones para pacientes

### Indicaciones para niños que controlen esfínteres y adultos.

1. Utilizar recipiente estéril (el mismo que utiliza para recolección de orina)
2. Defecar en un recipiente limpio y seco. Recolectar de ahí una porción de materia fecal con cuchara o espátula y colocarla en el recipiente estéril.
3. Conservar en heladera y llevar al laboratorio dentro de las 24hs de recolección del material.

### Indicaciones para niños que no controlan esfínteres.

1. Colocar el pañal del bebe dado vuelta (la parte absorbente del pañal que quede contrario a la cola del bebe). Esto es para evitar que la muestra de materia fecal se absorba en el pañal.
2. Luego seguir los mismos pasos del ítem anterior.

### **IMPORTANTE:**

Asegurarse de que la muestra no se contamine con orina.

**SOLO PARA HELICOBACTER PYLORI:** Dos semanas antes de la recolección del material suspender preferentemente (considerando indicación médica) los siguientes medicamentos:

- Inhibidores de bomba de protones (por ej., omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etc.)
- Antagonistas del receptor H2 (Por ej., ranitidina)
- Medicamentos que contengan bismuto
- Antibióticos (si estuvo bajo tratamiento para la erradicación de Helicobacter Pylori esperar como mínimo 4 semanas).