

INDICACIONES PARA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COLIRIOS

Indicaciones para pacientes

Se entregan 5 goteros, cada uno con un periodo de vencimiento de 2 meses a partir de su fecha de elaboración. Estos deben almacenarse a -20 °C en el freezer. El día antes de iniciar las aplicaciones, el gotero a utilizar debe ser colocado en la heladera a 4 °C.

Antes de cada aplicación, es fundamental lavarse las manos y evitar el contacto con el extremo del dosificador. Se debe seguir estrictamente la dosis y la frecuencia de uso diaria según lo indicado por el médico.

Cada gotero puede ser utilizado por un máximo de 7 días. Pasado ese tiempo, debe desecharse y utilizarse el siguiente gotero, ya que no contienen conservantes.

No debe utilizarse el producto si el líquido transparente se vuelve turbio, cambia de color (ámbar o rosa), o presenta alteraciones en su olor.

***IMPORTANTE:** Existen riesgos inherentes a la extracción de sangre venosa como dolor, inflamación o hematoma en el sitio de punción.

NO existe posibilidad de toxicidad o transmisión de enfermedades por tratarse de productos que se obtienen a partir de su propia sangre.

En cada procedimiento, se utiliza material estéril y descartable; luego de su utilización se desecha en contenedores bioseguros.

Otros riesgos están vinculados a la contaminación del producto durante su utilización por parte del paciente (dado que carece de conservantes). Para evitarlos hay que respetar las indicaciones para su adecuada conservación y utilización.

