

Indicaciones para cultivo de Micoplasmas genitales

(Ureaplasma spp. y Mycoplasma hominis)

Indicación para pacientes

Muestras:

- Las muestras posibles son: semen, exudado endocervical, exudado uretral, primer chorro de orina.

Preparación:

Todos los pacientes deben tener previo a la toma de la muestra: 48 hs. de abstinencia sexual y 5 días sin uso de antibióticos.

- **Semen:** remitir en un frasco estéril como mínimo 300 microlitos. Mantener a temperatura de 4-8°C hasta ser remitido al laboratorio.
- **Exudado endocervical:** tomar muestra con hisopo de plástico o dacrón (no se realiza con hisopo de mango de madera) y colocarlo en tubo estéril y seco (sin medio de transporte). Mantener a temperatura de 4-8°C hasta ser remitido al laboratorio. La muestra puede ser tomada por un médico o extraccionista de laboratorio.
- **Exudado uretral:** rotar hisopo de plástico o dacrón (no se realiza con hisopo de mango de madera) y colocarlo en tubo estéril y seco (sin medio de transporte). Mantener a temperatura de 4-8°C hasta ser remitido al laboratorio. La muestra puede ser tomada por un médico o extraccionista de laboratorio.
- **Primer chorro de orina:** remitir en frasco estéril no más de 10 ml. Mantener a temperatura de 4-8°C hasta ser remitido al laboratorio.