

CHLAMYDIA TRACHOMATIS y MYCOPLASMA GENITALIUM (Detección por PCR)

MUJERES

72 horas previas a la realización del estudio debe tener en cuenta:

- Mantener abstinencia sexual
- No aplicarse cremas ni óvulos, ni tomar antibióticos; o por lo menos haber terminado el esquema de tratamiento una semana previa a la toma de muestra.
- No utilizar desodorantes ni talcos.
- No realizar el estudio en periodo de menstruación.

Muestra: Cepillado endocervical. Se toma en el laboratorio.

Si la paciente está embarazada o por recomendación médica no puede realizarse cepillado endocervical consultar al laboratorio.



CHLAMYDIA TRACHOMATIS y MYCOPLASMA GENITALIUM (Detección por PCR)

HOMBRES

72 horas previas a la realización del estudio debe tener en cuenta:

- Mantener abstinencia sexual
- No realizar tratamiento con antibiótico o con cremas los días previos.

La muestra indicada es orina, excepto indicación específica de parte de médico/a para que el estudio se haga en semen o hisopado uretral (en este último caso se toma en el laboratorio).

Muestra: orina

Antes de recolectar la muestra realizar higiene genital externa con agua y jabón. El paciente debe tener una **retención urinaria de al menos 4 horas**. Recolectar el **primer chorro miccional** en frasco estéril (que cubra el fondo del frasco, pero que no supere 1 ó 2 cm de altura).

Muestra: semen

La obtención de la muestra se debe realizar por masturbación directa en un recipiente estéril, limpio y seco. Asegúrese de que toda la muestra se deposite dentro del recipiente. Si alguna porción de muestra se perdiera durante la recogida, debe ser notificado al laboratorio.

Entregar el material en el laboratorio **el mismo día de obtenido**, hasta las 16:00 hs.

