

## **Prueba de estímulo con TRH para TSH y/o PROLACTINA**

*Indicaciones para pacientes*

### **PREPARACIÓN PREVIA**

- Debe comprar en la farmacia la ampolla de TRH que será administrada para realizar la prueba de estímulo. El médico solicitante le hará un pedido de este medicamento para que pueda comprarlo por su obra social.
- Si el médico no se lo solicitó, tiene que comprar en la farmacia cualquiera de las siguientes presentaciones:
  - TRH Ferring inyectable 0,2 mg/mL o
  - TRH Elea 200 ug (ampolla liofilizada)
- Debe concurrir en ayunas entre las 7:00 h y las 9:00 h con el medicamento. Si está medicado con LT4, debe tomarla al terminar la prueba.

### **PRUEBA DE ESTÍMULO**

- La prueba consiste en tomar una muestra de sangre basal y luego administrar el medicamento vía endovenosa. Posteriormente le tomarán muestras de sangre en los tiempos que haya solicitado su médico, por lo cual tenga en cuenta que deberá permanecer en el laboratorio todo el tiempo que dure la prueba de estímulo.
- Durante toda la prueba debe permanecer en ayunas, sin fumar y solo está permitido tomar agua.

Recuerde que ante cualquier duda puede comunicarse con Secretaría del Laboratorio.